

INFORMACIÓN DEL PACIENTE
GVOKE® (Gee-voke)
(glucagón)
inyección, para uso subcutáneo

GVOKE (Gee-voke) VIALDX™
(glucagón)
inyección para uso intravenoso

¿Qué es GVOKE?

GVOKE es un medicamento recetado que se usa para lo siguiente:

- para tratar los niveles muy bajos de azúcar en sangre (hipoglucemia grave) en personas de 2 años o más con diabetes.

Se desconoce si GVOKE es seguro y eficaz en niños menores de 2 años.

¿Qué es GVOKE VialDx?

GVOKE VialDx es un medicamento recetado que se usa para lo siguiente:

- para detener el movimiento del estómago (inhibidor de la motilidad gastrointestinal) en adultos que reciben exámenes radiológicos.

Se desconoce si GVOKE VialDx es seguro y eficaz en niños.

No use GVOKE ni reciba GVOKE VialDx en estos casos:

- tiene un tumor en la glándula que se encuentra en la parte superior de los riñones (glándula suprarrenal), denominado feocromocitoma.
- tiene un tumor en el páncreas, denominado insulinoma.
- ha tenido una reacción alérgica al glucagón o a cualquiera de los ingredientes de GVOKE o GVOKE VialDx. Consulte el final de este folleto Informativo Para El Paciente para obtener una lista completa de los ingredientes de GVOKE y GVOKE VialDx.

No reciba GVOKE VialDx en estos casos:

- tiene tumores en el páncreas llamados Glucagonomas.

Antes de usar GVOKE o de recibir GVOKE VialDx, informe a su proveedor de atención médica acerca de todas sus afecciones médicas, incluso en los siguientes casos:

- tiene problemas de glándulas suprarrenales.
- tiene un tumor en el páncreas.
- no ha consumido alimentos o agua durante un largo tiempo (ayuno prolongado o inanición nutricional).
- tiene un nivel bajo de azúcar en sangre que no desaparece (hipoglucemia crónica).
- tiene diabetes mellitus.
- tiene problemas cardíacos.
- está embarazada o planea quedar embarazada. Se desconoce si GVOKE o GVOKE VialDx dañarán a su bebé en gestación.
- está en período de lactancia o planea amamantar. Se desconoce si el GVOKE pasa a la leche materna. Usted y su proveedor de atención médica deben decidir si puede usar GVOKE durante la lactancia.

Informe a su proveedor de atención médica acerca de todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos de venta libre y con receta, las vitaminas, y los suplementos a base de hierbas. El GVOKE y GVOKE VialDx pueden afectar la forma en que actúan otros medicamentos, y otros medicamentos pueden afectar la forma en que actúan el GVOKE y GVOKE VialDx. Conozca los medicamentos que toma. Lleve una lista de ellos para mostrarle a su proveedor de atención médica y farmacéutico cuando reciba un nuevo medicamento.

¿Cómo debo usar GVOKE?

- Lea las instrucciones de uso detalladas que se adjuntan al medicamento GVOKE.
- Use GVOKE exactamente como le indique su proveedor de atención médica.
- Asegúrese de que sus familiares, amigos cercanos, y cuidadores sepan dónde almacena GVOKE y cómo usarlo de la forma correcta **antes** de que necesite su ayuda.
- Actúe con rapidez. Tener un nivel muy bajo de azúcar en sangre durante un período de tiempo puede ser perjudicial.
- Despues de administrar GVOKE, el cuidador debe **llamar para obtener ayuda médica de emergencia de inmediato**.

- Cuando pueda tragar alimentos o bebidas de manera segura, su cuidador debe darle una fuente de azúcar de acción rápida (como una bebida sin alcohol o un jugo de frutas) y una fuente de azúcar de acción prolongada (como galletas y queso o un sándwich de carne).
- Si no responde al tratamiento después de 15 minutos, su cuidador puede darle otra dosis, si está disponible.

Informe a su proveedor de atención médica cada vez que utilice GVOKE. El nivel bajo de azúcar en sangre puede ocurrir de nuevo después de recibir una inyección de GVOKE. Puede que sea necesario cambiar su medicamento para la diabetes.

¿Cómo recibiré GVOKE VialDx?

- Un proveedor de atención médica administrará GVOKE VialDx a través de una aguja colocada en la vena (infusión i.v.).

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de GVOKE y GVOKE VialDx?

GVOKE y GVOKE VialDx pueden provocar efectos secundarios graves, que incluyen los siguientes:

- **hipertensión arterial.** GVOKE y GVOKE VialDx puede causar presión arterial alta en ciertas personas con tumores en las glándulas suprarrenales.
- **nivel bajo de azúcar en sangre.** El GVOKE y GVOKE VialDx pueden provocar niveles bajos de azúcar en sangre en personas con ciertos tumores en el páncreas, denominados insulinomas, al producir demasiada insulina en el organismo. GVOKE VialDx también puede causar niveles bajos de azúcar en sangre en personas con ciertos tumores, denominados glucagonomas. Los signos y los síntomas de un nivel bajo de azúcar en sangre pueden incluir:

○ sudoración	○ visión borrosa	○ comportamiento anormal
○ somnolencia	○ hambre	○ aturdimiento
○ mareos	○ dificultad en el habla	○ movimiento inestable
○ alteraciones del sueño	○ agitación	○ incapacidad para concentrarse
○ latidos cardíacos irregulares	○ estado de ánimo deprimido	○ cambios en la personalidad
○ ansiedad	○ hormigueo en las manos, los pies, los labios o la lengua	○ dolor de cabeza
○ temblor	○ irritabilidad	
- **reacción alérgica grave.** Se han producido reacciones alérgicas graves en algunas personas que usan productos con glucagón, el ingrediente activo de GVOKE y GVOKE VialDx. Deje de usar GVOKE y llame a su proveedor de atención médica o busque ayuda médica de inmediato si tiene una reacción alérgica grave. Si está recibiendo GVOKE VialDx para un examen radiológico y tiene una reacción alérgica grave, su proveedor de atención médica interrumpirá la infusión I.V.

Entre los síntomas de una reacción alérgica grave, se incluyen los siguientes:

- erupción
- dificultad para respirar
- hipotensión arterial.
- **nivel alto de azúcar en sangre con GVOKE VialDx.** Si tiene diabetes y recibe GVOKE VialDx antes de su examen radiológico, puede causar un nivel alto de azúcar en sangre. Su proveedor de atención médica controlará sus niveles de azúcar en sangre durante el tratamiento con GVOKE VialDx.
- **problemas cardíacos con GVOKE VialDx.** Si tiene problemas cardíacos y recibe GVOKE VialDx antes de su examen radiológico, es posible que aumente su presión arterial y pulso mientras recibe GVOKE VialDx. Esto podría ser potencialmente mortal. Su proveedor de atención médica controlará su corazón durante el tratamiento con GVOKE VialDx.

Los efectos secundarios más frecuentes de GVOKE en adultos incluyen los siguientes:

- náuseas
- hinchazón en el lugar de inyección
- vómitos
- dolor de cabeza

Los efectos secundarios más frecuentes de GVOKE en niños incluyen los siguientes:

- náuseas
- hiperglucemias
- dolor abdominal
- dolor o enrojecimiento en el lugar de inyección
- nivel bajo de azúcar en sangre
- vómitos
- dolor de cabeza
- picazón

Los efectos secundarios más frecuentes de GVOKE VialDx incluyen los siguientes:

- náuseas
- cambio en el sabor de los alimentos o pérdida del gusto (disgeusia)
- dolor de cabeza
- mareos
- sofocos

Estos no son todos los efectos secundarios posibles de GVOKE y GVOKE VialDx. Llame a su médico para obtener asesoramiento médico sobre los efectos secundarios. Puede informar los efectos secundarios a la FDA al 1-800-FDA-1088.

¿Cómo debo conservar GVOKE?

- Conserve GVOKE en el envase original hasta el momento de su uso.
- Almacene a temperatura ambiente entre 68 °F y 77 °F (20 °C y 25 °C).
- **No lo refrigerue ni congele.**

Mantenga GVOKE y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.**Información general sobre el uso seguro y eficaz de GVOKE.**

A veces, los medicamentos se recetan para fines distintos de los enumerados en un folleto Informativo Para El Paciente. No use GVOKE para una afección para la que no fue recetado. No les dé GVOKE a otras personas, incluso si tienen los mismos síntomas que usted. Puede hacerles daño. Puede pedirle a su farmacéutico o proveedor de atención médica información sobre GVOKE que está escrita para profesionales de la salud.

¿Cuáles son los ingredientes de GVOKE y GVOKE VialDx?

Ingrediente activo: glucagón.

Ingredientes inactivos: trehalosa dihidrato conforme al NF, ácido sulfúrico conforme al NF, manitol conforme a la USP (Gvoke Kit y Gvoke VialDx) y dimetilsulfóxido.

GVOKE es distribuido por: Xeris Pharmaceuticals, Inc., Chicago, IL

Para obtener más información, visite www.xerispharma.com o llame al 1-877-937-4737.

GVOKE VialDx es distribuido por American Regent, Inc.

Esta Información Para El Paciente ha sido aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos.

Publicada en: 05/2025

US-GVK-25-00053(v1) 7/25