



UN NIVEL MUY BAJO  
DE AZÚCAR EN SANGRE  
ES IMPREDECIBLE.  
¿ESTÁ LISTO PARA  
RESPONDER?

Descubra GVOKE HypoPen<sup>®</sup>, la pluma de rescate lista para usar que cualquiera puede utilizar con seguridad<sup>1,2</sup>



#### Indicación

GVOKE (glucagón) es un medicamento con receta médica que se usa para tratar los niveles muy bajos de azúcar en sangre en adultos y niños de 2 años o más con diabetes.

#### Información Importante de Seguridad

- No use GVOKE en los siguientes casos:
  - » Tiene un tumor en la glándula que se encuentra en la parte superior de los riñones, denominado feocromocitoma, debido al riesgo de aumento importante en la presión arterial.

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional a lo largo del documento y en la [página 14](#).

Consulte de forma completa la [Información de Prescripción](#) y la [Guía de Información para el Paciente](#) de GVOKE<sup>®</sup>.



## MANEJAR LOS NIVELES DE AZÚCAR EN SANGRE ES DESAFIANTE, SIN IMPORTAR CUÁN DEDICADO ESTÉ A SU PLAN DE TRATAMIENTO

Si está tratando su diabetes con insulina u otros medicamentos para la diabetes que se sabe causan un nivel bajo de azúcar en sangre, es común que tenga episodios de niveles bajos de azúcar en sangre. Sin embargo, si conoce los signos y síntomas, y tiene lo que se necesita en su kit de tratamiento para manejarlos, tanto usted como las personas que lo rodean pueden responder de manera rápida y segura.



## CONOZCA LOS SÍNTOMAS DE UN NIVEL BAJO DE AZÚCAR EN SANGRE Y TENGA LISTO SU KIT DE TRATAMIENTO.


### Puede sentirse de la siguiente manera:

- Tembloroso
- Mareado
- Confundido
- Malhumorado o agresivo
- Como si fuera difícil hablar
- Muy cansado

El nivel bajo de azúcar en sangre no tratado puede provocar convulsiones o desmayos. En casos graves, puede ser potencialmente mortal.

### Su kit de tratamiento para la diabetes debería tener:

- Comprimidos o gel de glucosa
- Jugo
- Caramelos
- Glucagón listo para usar



## ? ¿SABÍA USTED QUE?

Los lineamientos de la Asociación Americana de Diabetes y la Sociedad Endocrina indican que debe tener una receta médica de glucagón lista para usar si tiene un alto riesgo de desarrollar un nivel bajo de azúcar en sangre.<sup>3,4</sup>

**Consulte a su proveedor de atención médica sobre su nivel de riesgo.**



## ESTÉ PREPARADO PARA ENFRENTAR EL NIVEL BAJO DE AZÚCAR EN SANGRE, PASE LO QUE PASE

### ESTO ES LO QUE DEBE HACER:

#### 1. TRATARLO DE INMEDIATO

- Para una hipoglucemia leve (azúcar en sangre por debajo de 70 mg/dl) o hipoglucemia moderada (azúcar en sangre por debajo de 54 mg/dl)<sup>4,5</sup>:
  - » Trate rápidamente con 15 gramos de hidratos de carbohidratos orales de acción rápida (por ejemplo, comprimidos de glucosa o jugo).
  - » Vuelva a realizar la prueba a los 15 minutos y repita el proceso hasta alcanzar el nivel objetivo de azúcar en sangre.

#### 2. RECONOCER CUANDO NECESITA ALGO MÁS

- A veces, comer o beber para corregir el nivel de azúcar en sangre no es suficiente o no es posible.
- Debido a que el glucagón puede revertir rápidamente la hipoglucemia grave, se considera como un tratamiento principal para el nivel muy bajo de azúcar en sangre.<sup>3,5</sup>

GVOKE HypoPen<sup>®</sup> es su red de seguridad cuando más lo necesita.




#### Información Importante de Seguridad (continuación)

- No use GVOKE en los siguientes casos:
  - » Tiene un tumor en el páncreas, denominado insulinoma, debido al riesgo de niveles bajos de azúcar en sangre.

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional a lo largo del documento y en la [página 14](#).

Consulte de forma completa la [Información de Prescripción](#) y la [Guía de Información para el Paciente](#) de GVOKE<sup>®</sup>.



*“Solía pensar que los alimentos y los jugos eran más fáciles de consumir cuando tenía un bajón porque podía meterlos en una bolsa o llevarlos en el bolsillo, pero aprendí que los alimentos y los jugos por sí solos pueden no ayudarme cuando tengo un bajón grave”.*

**Charlie**

Paciente real de GVOKE HypoPen<sup>®</sup>



## GVOKE HYPOPEN® ES LA PLUMA DE RESCATE LISTA PARA USAR QUE CUALQUIERA PUEDE UTILIZAR CON SEGURIDAD<sup>1,2</sup>

### FUNCIONAMIENTO COMPROBADO\*

El 99 % (152/154) de los pacientes adultos alcanzó el éxito del tratamiento.<sup>6\*</sup>

### LISTA PARA USAR

Premezclada y lista para usar en cualquier momento.<sup>6</sup>

### SIMPLE DE ADMINISTRAR

Cualquiera puede administrarla en 2 simples pasos.<sup>1,2,7</sup>

### FUNCIONA RÁPIDAMENTE

Algunos pacientes comenzaron a sentir alivio de los síntomas de hipoglucemia tras unos pocos minutos.<sup>8,9,†</sup>

\* En dos estudios clínicos en adultos, los niveles de azúcar en sangre que eran inferiores a 50 mg/dl aumentaron por encima de 70 mg/dl o aumentaron en al menos 20 mg/dl en un plazo de 13.8 minutos en promedio.<sup>6</sup>

† En dos estudios clínicos en adultos, los investigadores midieron la rapidez con la que las personas comenzaron a sentirse mejor después de recibir una inyección de glucagón.<sup>8</sup> Descubrieron que algunos adultos comenzaron a sentir alivio tan solo 5 minutos después de la inyección.<sup>8,9</sup>

### Información Importante de Seguridad (continuación)

- No use GVOKE en los siguientes casos:
  - » Es alérgico al glucagón o a cualquier ingrediente inactivo de GVOKE. Deje de usar GVOKE y busque atención médica de inmediato si experimenta algún síntoma de reacción alérgica grave, como erupción, dificultad para respirar, o presión arterial baja.

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional a lo largo del documento y en la [página 14](#).

Consulte de forma completa la [Información de Prescripción](#) y la [Guía de Información para el Paciente](#) de GVOKE®.



VIDEOS DE PACIENTES



## TESTIMONIOS DE PACIENTES



*Tengo GVOKE® a la mano en todo momento. GVOKE es una herramienta esencial para mí. Ahora la llevo conmigo a todas partes.*

**Kenny**, paciente real de GVOKE



*De inmediato, tomé GVOKE HypoPen® y comencé a administrarla siguiendo el proceso de dos pasos. En 15 minutos, ya estaba despierto. Los niveles de azúcar en sangre volvieron a estar en un rango seguro.*

» **Kimberly**, madre de un paciente real de GVOKE



*GVOKE HypoPen® cabe en mi bolso. También está premezclada y toma tan solo dos pasos, lo que puede ahorrar tiempo valioso durante bajones graves.*

» **McKenzie**, paciente real de GVOKE

### Información Importante de Seguridad (continuación)

- Antes de usar GVOKE, informe a su médico acerca de todos los medicamentos que toma y sus afecciones médicas, incluso si no ha recibido alimentos ni agua durante un largo tiempo (ayuno prolongado o inanición nutricional), tiene un nivel bajo de azúcar en sangre que no desaparece (hipoglucemia crónica) o tiene antecedentes de erupción cutánea, denominada eritema necrolítico migratorio (asociado frecuentemente con tumores que producen glucagón).

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional a lo largo del documento y en la [página 14](#).

Consulte de forma completa la [Información de Prescripción](#) y la [Guía de Información para el Paciente](#) de GVOKE®.



## CON NIVELES MUY BAJOS DE AZÚCAR EN SANGRE, CADA SEGUNDO CUENTA

SOLO SE REQUIEREN 2 SIMPLES PASOS PARA ADMINISTRAR RÁPIDAMENTE GVOKE HYPOPEN®<sup>1,7</sup>



### 1. RETIRE ROJO

Retire la tapa roja.



### 2. PRESIONE AMARILLO

Presione el extremo amarillo hacia abajo en la piel y manténgalo así durante 5 segundos.

La ventana se pondrá roja cuando se complete el proceso.

GVOKE HypoPen se puede administrar en la parte superior externa del brazo, la parte inferior del abdomen o la parte externa del muslo.<sup>6</sup> Conservar en la bolsa original sellada hasta el momento de su uso.

#### Información Importante de Seguridad (continuación)

- Los efectos secundarios más frecuentes informados en adultos son náuseas, vómitos, hinchazón en el lugar de inyección, y dolor de cabeza.

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional a lo largo del documento y en la [página 14](#).

Consulte de forma completa la [Información de Prescripción](#) y la [Guía de Información para el Paciente](#) de GVOKE®.



INSTRUCCIONES

**Muestre a sus familiares, amigos cercanos o cuidadores dónde guarda GVOKE HypoPen® y cómo usarla.**

**Incluso puede autoadministrársela en situaciones determinadas.**

#### Información Importante de Seguridad (continuación)

- Los efectos secundarios más frecuentes informados en niños son náuseas, nivel bajo de azúcar en sangre, vómitos, dolor de cabeza, dolor abdominal, nivel alto de azúcar en sangre, dolor o enrojecimiento en el lugar de inyección, y urticaria.

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional a lo largo del documento y en la [página 14](#).

Consulte de forma completa la [Información de Prescripción](#) y la [Guía de Información para el Paciente](#) de GVOKE®.



## CUÁNDO USAR GVOKE HYPOPEN®

USE GVOKE HYPOPEN SI SE ENCUENTRA ANTE ALGUNA DE LAS SIGUIENTES SITUACIONES DURANTE UNA EMERGENCIA DE NIVEL BAJO DE AZÚCAR EN SANGRE<sup>7</sup>

1. Corregir con alimentos o bebidas no funciona
2. No puede tragar de forma segura
3. Siente que se desmaya
4. Se desmaya o tiene una convulsión

GVOKE HypoPen® se puede usar incluso antes de que usted o la persona a la que está ayudando se desmaye o tenga una convulsión.

### Información Importante de Seguridad (continuación)

- Informe a los cuidadores sobre las Instrucciones de uso de GVOKE y los síntomas de hipoglucemia grave, que incluyen pérdida del conocimiento y convulsiones o crisis convulsivas.

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional a lo largo del documento y en la [página 14](#).

Consulte de forma completa la [Información de Prescripción](#) y la [Guía de Información para el Paciente](#) de GVOKE®.



## SIEMPRE LLEVE CON USTED GVOKE HYPOPEN®

GUARDE GVOKE HYPOPEN 2-PACK™ EN SU HOGAR, EN LA ESCUELA Y EN EL TRABAJO, PARA QUE PUEDA LLEVARLA DONDE QUIERA.

### 0.5 mg por 0.1 ml

- Para pacientes de entre 2 y 11 años que pesan menos de 100 lb.<sup>6</sup>
- Dura 24 meses a partir de la fecha de fabricación si se almacena a temperatura ambiente.<sup>9</sup>



### 1 mg por 0.2 ml

- Para pacientes de 12 años o más y niños menores de 12 años que pesan ≥ 100 lb.<sup>6</sup>
- Dura 30 meses a partir de la fecha de fabricación si se almacena a temperatura ambiente.<sup>9</sup>



### Información Importante de Seguridad (continuación)

- Conservar en el envase original hasta el momento del uso y a temperatura ambiente entre 68 °F y 77 °F (20 °C y 25 °C).

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional a lo largo del documento y en la [página 14](#).

Consulte de forma completa la [Información de Prescripción](#) y la [Guía de Información para el Paciente](#) de GVOKE®.



## 4 PASOS PARA ASEGURARSE DE QUE ESTÁ PREPARADO PARA TRATAR UN NIVEL MUY BAJO DE AZÚCAR EN SANGRE



1. **Surta su receta médica de inmediato.**
2. **Revise el paso de administración: consulte las páginas 8 y 9 de este folleto o las instrucciones de uso de GVOKE HypoPen®**
3. **Manténgala a mano donde quiera que vaya y en los lugares que frecuente.**
4. **Muestre a sus amigos y familiares cómo usar GVOKE HypoPen. Asegúrese de que sepan dónde está y cuándo utilizarla.**

### Información Importante de Seguridad (continuación)

- Se le recomienda informar los efectos secundarios de fármacos recetados a la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA). Visite [www.fda.gov/medwatch](http://www.fda.gov/medwatch) o llame al 1-800-FDA-1088.

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional a lo largo del documento y en la [página 14](#).

Consulte de forma completa la [Información de Prescripción](#) y la [Guía de Información para el Paciente](#) de GVOKE®.



### Indicación

GVOKE (glucagón) es un medicamento con receta médica que se usa para tratar los niveles muy bajos de azúcar en sangre en adultos y niños de 2 años o más con diabetes.

### Información importante de seguridad

- No use GVOKE en los siguientes casos:
  - » Tiene un tumor en la glándula que se encuentra en la parte superior de los riñones, denominado feocromocitoma, debido al riesgo de aumento importante en la presión arterial.
  - » Tiene un tumor en el páncreas, denominado insulinoma, debido al riesgo de niveles bajos de azúcar en sangre.
  - » Es alérgico al glucagón o a cualquier ingrediente inactivo de GVOKE. Deje de usar GVOKE y busque atención médica de inmediato si experimenta algún síntoma de reacción alérgica grave, como erupción, dificultad para respirar, o presión arterial baja.
- Antes de usar GVOKE, informe a su médico acerca de todos los medicamentos que toma y sus afecciones médicas, incluso si no ha recibido alimentos ni agua durante un largo tiempo (ayuno prolongado o inanición nutricional), tiene un nivel bajo de azúcar en sangre que no desaparece (hipoglucemia crónica) o tiene antecedentes de erupción cutánea, denominada eritema necrolítico migratorio (asociado frecuentemente con tumores que producen glucagón).
- Los efectos secundarios más frecuentes informados en adultos son náuseas, vómitos, hinchazón en el lugar de inyección, y dolor de cabeza.
- Los efectos secundarios más frecuentes informados en niños son náuseas, nivel bajo de azúcar en sangre, vómitos, dolor de cabeza, dolor abdominal, nivel alto de azúcar en sangre, dolor o enrojecimiento en el lugar de inyección, y urticaria.
- Informe a los cuidadores sobre las Instrucciones de uso de GVOKE y los síntomas de hipoglucemia grave, que incluyen pérdida del conocimiento y convulsiones o crisis convulsivas.
- Conservar en el envase original hasta el momento del uso y a temperatura ambiente entre 68 °F y 77 °F (20 °C y 25 °C).
- Se le recomienda informar los efectos secundarios de fármacos recetados a la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA). Visite [www.fda.gov/medwatch](http://www.fda.gov/medwatch) o llame al 1-800-FDA-1088.

Hable con su médico y consulte la [Información de Prescripción completa](#) y la [Guía de Información para el Paciente de GVOKE®](#).



## AHORRE DINERO EN GVOKE HYPOPEN®

- Los pacientes elegibles con seguro comercial pueden pagar tan solo \$25 con la [Tarjeta de copago de GVOKE®](#).\*



- Si no califica para la tarjeta de copago, es posible que pueda obtener asistencia a través del [Programa de Asistencia al Paciente](#).

¿TIENE PREGUNTAS?

Llame al 1-877-myGVOKE (1-877-694-8653)

Consulte de forma completa la [Información de Prescripción](#) y la [Guía de Información para el Paciente de GVOKE®](#).



**Referencias:** **1.** Valentine V, Newswanger B, Prestrelski S, Andre AD, Garibaldi M. Human factors usability and validation studies of a glucagon autoinjector in a simulated severe hypoglycemia rescue situation. *Diabetes Technol Ther.* 2019;21(9):522-530. **2.** Meyer JM, Devona MC. U.S. Survey investigating gaps between patients and specialists in the treatment of severe hypoglycemia and impressions of the ease-of-use of liquid-stable glucagon for subcutaneous injection. *Int Arch Endocrinol Clin Res.* 2021;7(1):025. **3.** McCall AL, Lieb DC, Gianchandani R, et al. Management of individuals with diabetes at high risk for hypoglycemia: an Endocrine Society clinical practice guideline. *J Clin Endocrinol Metab.* 2023;108(3):529-562. doi:10.1210/clinem/dgac596. **4.** American Diabetes Association Professional Practice Committee. 6. Glycemic Goals and Hypoglycemia: Standards of Care in Diabetes—2025. *Diabetes Care.* 2025; 48 (Supplement\_1): S128–S145. <https://doi.org/10.2337/dc25-S006>. **5.** Treatment of low blood sugar (hypoglycemia). Centers for Disease Control and Prevention. Consultado el 25 de mayo de 2025. <https://www.cdc.gov/diabetes/treatment/treatment-low-blood-sugar-hypoglycemia.html>. **6.** GVOKE [información de prescripción]. Chicago, IL: Xeris Pharmaceuticals, Inc. **7.** GVOKE HypoPen [Instrucciones de uso]. Chicago, IL: Xeris Pharmaceuticals, Inc. **8.** Christiansen MP, Cummins M, Prestrelski S, Close NC, Nguyen A, Junaidi K. Comparison of a ready-to-use liquid glucagon injection administered by autoinjector to glucagon emergency kit for the symptomatic relief of severe hypoglycemia: two randomized crossover non-inferiority studies. *BMJ Open Diabetes Res Care.* 2021;9(1):e002137. doi:10.1136/bmjdr-2021-002137. **9.** Datos en archivo. Xeris Pharmaceuticals, Inc.

GVOKE®, GVOKE HypoPen®, GVOKE HypoPen 2-Pack™, el diseño en forma de gota, Xeris Pharmaceuticals® y sus logotipos asociados son marcas comerciales de Xeris Pharmaceuticals, Inc. Derechos de autor ©2024-2025 Xeris Pharmaceuticals, Inc. Todos los derechos reservados. US-GVKHP-25-00076(v1) 9/2025

